Datei: vögel.html

...

Unter den Vögeln

unterscheidet man bezüglich

ihrer Zuggewohnheiten

Standvögel, Strichvögel,

Zugvögel und Teilzieher.

...

Datei: typen.html

Standvögel bleiben während des ganzen Jahres in der Nähe ihrer Nistplätze.
Beispiele: Dompfaff, Haussperling, Amsel, Buchfink.

Strichvögel schweifen nach der Brutzeit meistens in Schwärmen in einem größeren Umkreis umher.
Beispiele: Bluthänfling, Grünling, Stieglitz

Zugvögel sind Vögel, die alljährlich in ihre artspezifischen Winter– bzw. Brutgebiete ziehen.

Quelltext vögel.html:

```
Unter den V&ouml;geln unterscheidet man
bez&uuml;glich ihrer Zuggewohnheiten
<A HREF=„typen.html#stand“>Standv&ouml;gel</A>,
<A HREF=„typen.html#strich“>Strichv&ouml;gel</A>,
<A HREF=„typen.html#zug“>Zugv&ouml;gel</A> und
Teilzieher.
```

Quelltext typen.html:

```
<A NAME=„stand“>Standv&ouml;gel</A> bleiben
w&auml;hrend des ganzen Jahres in der N&auml;he ih-
rer Nistpl&auml;tze.
Beispiele: Dompfaff, Haussperling, Amsel, Buchfink.

<A NAME=„zug“>Zugv&ouml;gel</A> sind V&ouml;gel,
die allj&auml;hrlich in ihre artspezifischen Win-
ter– bzw. Brutgebiete ziehen.

<A NAME=„strich“>Strichv&ouml;gel</A> schweifen
nach der Brutzeit meistens in Schw&auml;rmen in ei-
nem gr&ouml;&szlig;eren Umkreis umher.
```